

ارزیابی مواجهه پوستی پرسنل بخش‌های انکولوژی با داروهای شیمی درمانی با استفاده از روش DREAM در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۴

^٤ یاسین منصوری^۱، علی دهقانی^۲، ابوالفضل برخورداری^۳، محمدجواد زارع سخویدی*

چکیده

مقدمه: مواجهه با داروهای ضد سرطان (ANDs) از طریق تماس پوستی یکی از عمدۀ راههای مواجهه پرسنل بخش‌های انکولوژی در بیمارستان‌ها می‌باشد. آژانس بین‌المللی تحقیق بر روی سرطان (IARC) چندین داروی ضد سرطان (ANDs) را به عنوان سرطان‌زا تعیین نموده است. از این رو بررسی میزان مواجهه با این داروها ضرورت دارد.

روش بررسی: کاربرد روش DREAM در تعیین مواجهه پوستی تعداد ۲۲ نفر از پرسنل بخش‌های شیمی درمانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بررسی گردید. مواجهه‌های انتشاری، جایگزینی و انتقالی برای تمامی قسمت‌های بدن به‌وسیله ارزیابی احتمال و شدت محاسبه گردید. بر این اساس مواجهه بالقوه و مواجهه حقیقی محاسبه گردید و بخش‌های انکولوزی از لحاظ میانگین نمره مواجهه رده‌بندی شدند.

نتایج: بیشترین نمره مواجهه جایگزینی میانگین (۱/۴۰۹) و انحراف استاندارد (۰/۱۲۷)، در کارکنان بخش بقایی پور و بیشترین نمره مواجهه انتقالی میانگین (۰/۳۵۰) و انحراف استاندارد (۰/۰) در بخش «امام حسن (ع)» و بیشترین نمره مواجهه انتشاری میانگین (۰/۹۸۰) و انحراف استاندارد (۰/۱۱۴) در بخش «داخلی-۱» مشاهده گردید. بیشترین نمره مواجهه احتمالی میانگین (۰/۱۳۳) و انحراف استاندارد (۰/۰) در بخش «امام حسن (ع)» و بیشترین نمره مواجهه واقعی میانگین (۰/۱۶۳) و انحراف استاندارد (۰/۰) در بخش «داخلی-۱» مشاهده گردید.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت هر چند زمان بر بودن و محاسبات تا حدودی پیچیده را می توان از موانع به کار گیری روزمره این روش بر شمرد اما روش ارزیابی نیمه کمی مواجهه پوستی DREAM می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر باشد، ارزیابی اولیه محیط های کاری استفاده گردید.

¹ دانشجوی کارشناسی، ارشد مهندسی، بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، شهید صدوقی، بزد، بزد، ایران.

^۲ استاد بارگه آمار نیست و ایده‌مولوژی، دانشکده علوم بنیاد شعبه صدوق بند، بند، ابان.

^{۲۰} استاد گرچه معتقدست بعثت داشته باشد، داشتگان علم و زنگنه شعبه نهمین دهه از این

اسدر درود شهادتی بهداشت داشتند. ششم پرسنلی شهید شدند. یزد، یزد ایران.

دانسیار کروه مهندسی بهداشت حرقه‌ای، دانشگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

نویسنده مسئول: تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۴۸۱۰۰، پست الکترونیک: info@najafabadi.com

مقدمه

پوست راه عمدہ مواجهه محسوب می گردد (۶). از طرفی دیگر مواجهه شغلی با داروهای ضد سلطان در بخش‌های انکولوژی به طور مستقیم با کم اثر بودن فرآیند تمیز کردن و در حقیقت با محلول‌های پاک‌کننده مورد استفاده برای تمیز کردن سطوح، در ارتباط است (۴). پرسنل شاغل در بخش‌های انکولوژی از جمله گروه‌هایی هستند که تماس شغلی آن‌ها با داروهای ضد سلطان کاملاً محتمل است (۴). مطالعات قبلی بر روی کارکنان بهداشتی بخش‌های بستری و سرپایی در ایران نشان داده است که رعایت گایدلاین‌های ایمنی ضعیف می‌باشد. نتایج مطالعه رجبی و همکاران نشان داده است که پرستاران و پزشکان در این مراکز، مواد سیوتوكسیک را در محیط‌های باز داخل بخش‌ها بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی و لباس مناسب، آماده‌سازی می‌کنند (۴).

در طول سال‌های اخیر روش DREAM به عنوان یک روش نیمه کمی برای ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی و بیولوژیکی مورد توجه واقع گردیده است (۷، ۸). قابلیت استفاده از این روش در مطالعات بهداشت حرفة‌ای و اپیدمیولوژیکی و همچنین عدم نیاز به سویله و هزینه‌ای خاص، آن را به ابزاری بالقوه در ارزیابی‌های مواجهه پوستی بدل نموده است. این روش به طور سیستماتیک انتقال آلاینده از محیط کار به سطح پوست را از سه طریق انتشار، جایگزینی و انتقال مورد بررسی قرار می‌دهد. مواجهه انتشاری بیانگر مواجهه پوست یا لباس کار با آلاینده در نتیجه تماس مستقیم با منبع آلودگی (از قبیل فرو بردن دست در ظروف حاوی آلاینده) می‌باشد. مواجهه پوستی با آلاینده از راه سطوح و ابزار کار آلوده نیز بیانگر شیوه انتقالی مواجهه است. همچنین مواجهه پوستی با آلاینده در اثر نشستن ذرات موجود در هوا و نشستن بر روی لباس کار یا پوست را نیز مواجهه جایگزینی می‌نمند. روش DREAM گرینه مناسبی برای ارزیابی مواجهه پوستی می‌باشد (۷، ۹). به دلیل عدم نیاز به ابزارهای پیشرفته، اندازه‌گیری روش DREAM و داده‌های به دست آمده از آن را می‌توان در ارزیابی ریسک با هدف مطابقت با قانون و استانداردها نیز به طور وسیع به کار گرفت (۱۰).

سه راه معمول ورود مواد شیمیایی به بدن انسان عبارت است از: تنفس، گوارش و جذب از راه پوست؛ راههای تنفسی و گوارشی به میزان خوبی مورد بررسی قرار گرفته‌اند در حالی که هنوز در مورد جذب پوستی کمبود دانش وجود دارد. تا اواسط دهه شصت میلادی پوست به عنوان یک مسیر تقریباً غیرقابل نفوذ برای ورود عوامل شیمیایی به بدن تصور می‌شد. در طول چند سال اخیر عمدتاً به خاطر کاهش مواجهه تنفسی با سومون اهمیت مواجهه از راه پوست افزایش یافته است (۱). آژانس بین‌المللی تحقیق بر روی سلطان (IARC) بر اساس یافته‌های اپیدمیولوژیک، اطلاعات سرطان‌زا در حیوانات و نتایج مطالعات ژنتوکسیک در محیط‌های آزمایشگاهی چندین داروی ضد سلطان (ANDs) را به عنوان سرطان‌زا تعیین نموده است (۲). این داروها همچنین در گروه داروهای خطرناک تقسیم‌بندی گردیده‌اند.

انجمن داروسازان بهداشت آمریکا (ASHP) داروهایی که دارای سمیت ژنتیکی، سلطان‌زا، جهش‌زا، تأثیر منفی بر روی باروری و یا سایر ارگان‌های جدی بدن باشند و یا هر سم شناخته شده‌ای که در دوزهای پایین در حیوانات و یا در انسان نتایج فوق را بددهد را داروهای خطرناک نامیده است (۳). از آنجا که ADNs در تشخیص و تحریب سلول‌های سرطانی اختصاصی عمل نمی‌کنند و می‌توانند به سلول‌های سالم نیز آسیب بزنند. این پدیده باعث می‌شود تا کارکنان بخش‌های بیمارستانی را به واسطه‌ی تماس شغلی درگیر کند. مواجهه حاد با این داروها باعث ایجاد علائم زودگذر از قبیل سردرد، تهوع، کسالت، سرگیجه، راش پوستی، درماتیت و التهاب غشاء موکوسی یا اولسراسیون و التهاب چشم یا گلو می‌گردد (۴). همچنین اثرات جانبی ناشی از تماس‌های تکراری و طولانی مدت با این داروها نیز مشخص گردیده است (۴). مواجهه با این داروها از سه عمدہ استنشاقی (در اثر تماس با آئروسل‌های این داروها)، تماس مستقیم پوست با این داروها و راه گوارشی (به خاطر تماس دستان آلوده با دهان که احتمال آن کمتر است) محتمل است (۵، ۶). امروزه به خاطر تکامل و پیشرفت تکنیک‌های حفاظتی مانند کابینت‌های حفاظتی بیولوژیک (BSC)، مواجهه تنفسی تا حد زیادی کاهش یافته و مواجهه از طریق

حقیقی، انتقالی، جایگزینی و انتشاری تعیین گردید. در چکلیست DREAM بر اساس دستورالعمل DREAM امتیازات مورد نیاز بهمنظور تعیین حالت فیزیکی شیمیایی و غلظت داروهای ANDs در جدول مربوطه تعیین گردید (۸). سپس از این امتیازات برای محاسبه میزان انتشار ذاتی داروهای ANDs مطابق با معادلات ۱ تا ۳ استفاده گردید (۸).

معادله (۱):

انتشار ذاتی برای جامدات- چسبندگی و رطوبت ×

آلودگی × شکل جامدات × غلظت × حالت ماده

معادله (۲):

انتشار ذاتی مایعات - ویسکوزیته × غلظت × نقطه تبخیر ×
حالت ماده

معادله (۳):

انتشار ذاتی بخارات - غلظت × حالت ماده
میانگین نمره کل انواع مواجهه‌های انتشاری (E)،
جایگزینی (D) و انتقالی (T) برای بدن و نیز به تفکیک
قسمت‌های نه‌گانه بدن و نیز میزان امتیازات احتمال و
شدت مربوط به هریک از مسیرهای مواجهه بر اساس
پروتکل پیشنهادشده توسط DE-JOODE و همکاران
تعیین گردید (۸).

معادله (۴ و ۵):

$$E_{BP} = ER_E \cdot P_{E,BP} \cdot I_{E,BP} \cdot E_I$$

$$E_{TOT} = \sum_{BP=1-9} E_{BP}$$

معادله (۶ و ۷):

$$D_{BP} = ER_D \cdot P_{D,BP} \cdot I_{D,BP} \cdot E_I$$

$$D_{TOT} = \sum_{BP=1-9} D_{BP}$$

معادله (۸ و ۹):

$$T_{BP} = ER_T \cdot P_{T,BP} \cdot I_{T,BP} \cdot E_I$$

$$T_{TOT} = \sum_{BP=1-9} T_{BP}$$

در معادلات فوق P احتمال و I شدت را در مواجهه‌های مختلف نشان می‌دهند. ER فاکتور مسیر مواجهه نام دارد که در مورد مسیر مواجهه انتشاری دارای امتیاز ۳ و در مواجهه‌های انتقالی و جایگزینی دارای امتیاز ۱ می‌باشد. علت اختصاص امتیاز ۳ به فاکتور مسیر انتشاری آن است که جرم آلاینده در انتقال از این مسیر به صورت مستقیم بر روی پوست یا لباس دریافت می‌گردد در حالی که در مسیرهای جایگزینی یا انتقالی جرم آلاینده پس از عبور از مسیر هوا یا سطوح کار به لباس یا پوست می‌رسد که

لذا با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت سلامت کارکنان و پرستاران بخش‌های بیمارستانی که به صورت روتین در بخش‌های انکولوژی درگیر آماده‌سازی و تجویز داروهای ضد سرطان (ANDs) می‌باشند و نیز سهولت DREAM، نسبی روش نیمه کمی ارزیابی مواجهه پوستی آن مطالعه باهدف ارزیابی مواجهه پوستی شاغلان بخش‌های انکولوژی با داروهای ضد سرطان (ANDs) در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد انجام پذیرفت.

روش برسی

این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر اهداف یک مطالعه توصیفی و همبستگی می‌باشد. افراد مورد مطالعه شامل ۲۲ نفر شاغل در سه بخش انکولوژی بیمارستان‌های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد بودند. نمونه‌گیری به صورت سرشماری، بر اساس اطلاعات دریافتی از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد و کارگزینی بیمارستان‌های مربوطه انجام گرفت. پرسنل این بخش‌ها که در یکی از وظایف آماده‌سازی و تزریق داروهای ضد سرطان (ANDs) انجام وظیفه می‌کردند به شرط داشتن تمایل به همکاری در این تحقیق وارد شدند. به افراد، در مورد هدف از انجام پژوهش، نحوه جمع‌آوری داده‌ها و استفاده از آن‌ها، بی‌نام و نشان بودن پرسشنامه و محفوظ ماندن اطلاعات فردی اطمینان لازم داده شد. هر کدام از افراد در طول سه شیفت کاری و با فاصله زمانی حداقل یک هفته به‌دقت مورد مشاهده و ثبت اطلاعات قرار گرفتند. چکلیست ارزیابی مواجهه پوستی به روش نیمه کمی DREAM تهیه گردید. چکلیست ارزیابی نیمه کمی مواجهه پوستی DREAM بر اساس پروتکل آن شامل ۳ بخش بود که بخش اول شامل اطلاعات خواص فیزیکی و شیمیایی داروهای ANDs، بخش دوم احتمال و شدت هر یک از مسیرهای مواجهه و بخش سوم هم فاکتور حفاظتی لباس است که توسط یک نفر از اعضای تیم تحقیق ۳ مرتبه و در فواصل زمانی چند روزه (حداقل یک هفته) برای هر نمونه تکمیل شد و در نهایت پس از انجام ارزیابی‌های لازم برای هریک از قسمت‌های نه‌گانه بدن (سر، بازوها، ساعدتها، دست‌ها، بالاتنه پشتی، بالاتنه جلویی، بخش پایین بدن، پایین پاها و پاهای) مقادیر نمره حداقل و حداقل و نیز میانگین مواجهه‌های احتمالی،

دسته‌بندی ۰ تا ۶ بر اساس روش استاندارد دسته‌بندی گردیدند.

دسته (۰): بدون مواجهه مقدار عددی برابر ۰ است؛ دسته (۱): مواجهه سیار کم که مقدار عددی آن کمتر از ۱۰ می‌باشد؛ دسته (۲): مواجهه کم که مقدار عددی آن بین ۱۰-۳۰ است؛ دسته (۳): مواجهه متوسط که مقدار عددی آن بین ۳۰-۱۰۰ می‌باشد؛ دسته (۴): مواجهه زیاد مقدار عددی آن بین ۱۰۰-۳۰۰ می‌باشد؛ دسته (۵): مواجهه بسیار زیاد مقدار عددی آن بین ۳۰۰-۱۰۰۰ می‌باشد؛ دسته (۶): مواجهه بیش از حد زیاد که مقدار عددی آن بیشتر از ۱۰۰۰ می‌باشد (۸).

جمع‌آوری داده‌ها به وسیله مصاحبه حضوری و چکلیست ارزیابی مواجهه نیمه کمی DREAM صورت پذیرفت و تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS V.21 انجام گرفت. برای مقایسه میزان انواع مواجهه به تفکیک بخش‌های بیمارستان با توجه به حجم نمونه در زیرگروه‌های مختلف از آنالیز واریانس و تست‌های تعقیبی Kruskal Wallis توکی و از آزمون‌های آماری ناپارامتری استفاده گردید.

نتایج

جدول شماره ۱ مقادیر میانگین نمره مواجهه انتشاری در بخش‌های مختلف بدن به تفکیک بخش‌های مختلف شیمی‌درمانی را نشان می‌دهد. هرچند به خاطر کم بودن حجم نمونه تفاوت‌های بین بخش‌های مختلف شیمی‌درمانی معنادار نشدند. اما به دلیل استفاده کارکنان بخش «داخلی-۱» از دستکش‌های نایلونی که تماس مناسبی با سطح پوست برقرار نمی‌کنند به جای نوع لاتکس از نظر تیم تحقیق مقادیر مواجهه انتشاری در گروه «داخلی-۱» بالاتر از سایر بخش‌های شیمی‌درمانی بود (۷).

جدول ۱. مقایسه میانگین نمره مواجهه انتشاری (انحراف استاندارد)

بخش شیمی‌درمانی	سر	بازو	ساعده	دستها	بالاتنه جلویی	مجموع پاها			پایین پشتی	پایین بدن	پایین پاها	مجموع
						بالاتنه	جلویی	بالاتنه				
داخلی-۱	.	.	.	۰/۸۰۶	۰/۹۸۰
	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰/۱۱۴)
امام حسن (ع)	.	.	.	۰/۷۰۰	۰/۷۰۰
	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰/۷۵۰)
بقایی پور	.	.	.	۰/۷۵۰	۰/۷۵۰
	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰/۰۵۰)
P -value				۰/۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۰/۵۶۲

طبعاً مقداری از جرم آلاینده در مسیر انتقال کاهش می‌باید (۸). برای تعیین نمره میانگین مواجهه احتمالی کل بدن و نیز به تفکیک بخش‌های مختلف بدن از معادلات ۱۰ و ۱۱ استفاده گردید.

معادله (۱۰):

$$\text{Skin-P} = \sum_{\text{BP}=1-9} \text{Skin-P}_{\text{BP}}$$

معادله (۱۱):

$$\text{Skin-P}_{\text{BP}} = \text{E}_{\text{BP}} + \text{D}_{\text{BP}} + \text{T}_{\text{BP}}$$

فاکتورهای نهایی محافظتی لباس و دست‌ها با دخالت دادن عوامل اثرگذار بر آن‌ها شامل: فاکتور حفاظتی لباس (PFM)، نوع لباس یا دستکش استفاده شده (M)، چفت شدن با تماس مناسب دستکش‌ها با دست و سرآستین‌ها (GC)، پوشیدن دستکش دوم بر روی دستکش اول (UG)، تعداد دفعات جایگزینی دستکش اول حین کار (RF) تعداد دفعات جایگزینی دستکش دوم حین کار (URF) طول مدت‌زمان پوشیدن دستکش‌های اول و دوم در شیفت کاری (GD) استفاده از کرم‌های محافظتی پوست (BC) در نظر گرفته می‌شود به هرکدام از موارد فوق یک امتیاز تعلق می‌گیرد و سرانجام بر اساس معادله ۱۲ و ۱۳ فاکتورهای نهایی محافظتی لباس برای دست‌ها و سایر بخش‌های بدن استخراج گردید.

معادله (۱۲):

$$\text{O}_{\text{HA}} = \text{M.PFM}_{\text{HA}}.\text{RF.GC.GD.UG.URF.BC}$$

معادله (۱۳):

$$\text{O}_{\text{BP}} = \text{M.PFM}_{\text{BP}}.\text{RF}$$

مواجهه پوستی حقیقی برای هرکدام از قسمت‌های بدن، دست‌ها و در مجموع کل بدن با تأثیر دادن فاکتورهای محافظتی لباس برای هر قسمت بدن و نیز برای دست‌ها در مقدار نمرات مواجهه‌های احتمالی آن‌ها محاسبه گردید. میانگین نمرات مواجهه‌های حقیقی در

جدول ۲. مقایسه میانگین نمره مواجهه جایگزینی (انحراف استاندارد)

بعضی‌درمانی	سر	بازو	ساعده	دستها	بالاتنه	جلویی	پشتی	بالاتنه	پایین بدن	پایین پاها	پاها	مجموع
داخلی-۱	.۰/۳۵	.۰/۴۹	.۰/۲۲۳	.۰/۲۲۹	.۰/۱۹۶	.۰/۱۴۵	.۰/۱۸۰	.۰/۱۸۰	.	.	.	۱/۰۸۸
امام حسن (ع)	(۰/۰/۱۱)	(۰/۰/۱۷)	(۰/۰/۱۴)	(۰/۰/۱۳)	(۰/۰/۱۵)	(۰/۰/۱۳)	(۰/۰/۱۴)	(۰/۰/۱۴)	(۰/۰/۱۴)	(۰/۰/۱۰)	(۰/۰/۱۰)	(۰/۱/۲۸)
بقایی پور	(۰)	(۰)	۰/۳۰۰
۱/۰۴۰۹	(۰/۰/۰۹)
۰/۱۵۷	(۰)	(۰)	(۰/۰/۵۳)	(۰/۰/۳۵)	(۰/۰/۱۹)	(۰/۰/۱۹)	(۰/۰/۱۹)	(۰/۰/۱۹)	(۰/۰/۱۹)	(۰/۰/۱۹)	(۰/۰/۱۹)	(۰/۱/۲۷)
P -value												۰/۱۵۲

بخش‌های شیمی‌درمانی در بخش مواجهه ناحیه بالاتنه پشتی تفاوت معناداری را نشان می‌دهد (جدول ۲).

بیشترین نمره مجموع مواجهه جایگزینی مربوط به بخش شیمی‌درمانی «بقایی پور» بود که در مقایسه با سایر

جدول ۳. مقایسه میانگین نمره مواجهه انتقالی (انحراف استاندارد)

بعضی‌درمانی	سر	بازو	ساعده	دستها	بالاتنه	جلویی	پشتی	بالاتنه	پایین بدن	پایین پاها	پاها	مجموع
داخلی-۱	(۰)	(۰)	۱/۰۲۲
امام حسن (ع)	(۰/۰/۱۳)	(۰/۰/۱۳)	(۰/۰/۱۳)	(۰/۰/۱۳)	(۰/۰/۱۵)	(۰/۰/۱۵)	(۰/۰/۱۵)	(۰/۰/۱۵)	(۰/۰/۱۷)	(۰/۰/۱۷)	(۰/۰/۷۳)	(۰/۱/۰۷۳)
بقایی پور	(۰)	(۰)	۰/۵۰۰
۱/۰۵۸۴	(۰/۰/۱۰)
۰/۰۰۰	-	-	(۰/۰/۰۰)
P -value												

نمره مواجهه انتقالی در بخش «بقایی پور» بیشتر از بخش «داخلی-۱» بود.

مواجهه انتقالی بخش‌های مختلف شیمی‌درمانی در جدول ۳ آمده است. مقدار مشاهده شده بخش «امام حسن (ع)» بیشتر از سایر بخش‌های شیمی‌درمانی بود.

جدول ۴. مقایسه میانگین نمره مواجهه احتمالی (انحراف استاندارد)

بعضی‌درمانی	سر	بازو	ساعده	دستها	بالاتنه	جلویی	پشتی	بالاتنه	پایین بدن	پایین پاها	پاها	مجموع
داخلی-۱	(۰/۰/۱۱)	(۰/۰/۱۷)	(۰/۰/۲۸)	(۰/۰/۱۵)	(۰/۱/۰۵)	(۰/۱/۰۵)	(۰/۰/۴۲)	(۰/۰/۴۲)	(۰/۰/۲۶)	(۰/۰/۰)	(۰)	۲/۹۵۵
امام حسن	۵/۱۳۳
بقایی پور	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۳/۵۸۳
۰/۰۶۱	-	-	(۰/۰/۲۱)
P -value												

احتمالی کل در بخش‌های «امام حسن (ع)» و «بقایی پور» می‌تواند به خاطر حجم بالای آماده‌سازی داروهای ضد سلطان در هر شیفت کاری به ازای هر یک از پرسنل باشد که در مقایسه با بخش «داخلی-۱» در بخش‌های «امام حسن (ع)» و «بقایی پور» بالاتر بود.

جدول ۴ مقایسه میانگین نمره مواجهه احتمالی در بخش‌های مختلف شیمی‌درمانی را نشان می‌دهد. بیشترین نمره مواجهه مربوط به بخش «امام حسن (ع)» بود و در مواجهه احتمالی در بخش «بقایی پور» بیشتر از «داخلی-۱» می‌باشد. تفاوت نمره در قسمت‌های ساعده، بالاتنه و پایین بدن وجود داشت. علت بالا بودن نمره مواجهه

جدول ۵. مقایسه میانگین نمره مواجهه واقعی (انحراف استاندارد)

	بخش شیمی‌درمانی	سر	بازو	ساعده	دستها	بالاتنه	جلویی	پشتی	بدن	پایین	پاها	مجموع
۱/۱۶۳	داخلی-۱	۰/۰۰۵	۰/۰۰۹	۰/۰۸۳	۰/۷۳۴	۰/۰۷۱	۰/۰۵۷	۰/۰۷۰	۰/۰۷۰	۰/۰۷۰	۰	۰
(۰/۱۵۲)	(امام حسن (ع))	(۰/۰۰۲)	(۰/۰۰۳)	(۰/۰۱۴)	(۰/۱۱۵)	(۰/۰۰۹)	(۰/۰۱۳)	(۰/۰۱۳)	(۰/۰۱۳)	(۰/۰۱۳)	(۰)	(۰)
۰/۴۳۵	باقایی پور	۰	۰	۰/۱۰۸	۰/۰۳۰	۰/۰۸۱	۰/۱۰۸	۰/۰۸۱	۰/۰۸۱	۰/۰۸۱	۰	۰
۰/۳۴۵	(۰/۱۲۴)	(۰)	(۰)	(۰/۰۰۶)	(۰/۰۶۳)	(۰/۰۰۳)	(۰/۰۰۶)	(۰/۰۰۶)	(۰/۰۰۳)	(۰/۰۰۳)	(۰)	(۰)
۰/۰۴۷	P -value	۰/۳۰۸	۰/۳۸۵	۰/۰۶۷	۰/۰۲۷	۰/۶۶۴	۰/۶۶۳	۰/۶۰۷	۰/۶۰۷	۰/۶۰۷	-	-

پراکندگی داده‌ها در مطالعات قبلی نیز گزارش شده است (۷، ۱۲). از روش DREAM می‌توان به عنوان ابزاری برای تعیین موارد مؤثر بر میزان مواجهه پوستی استفاده نمود (۷، ۱۳). آنگاه که تفاوت معنادار بین میزان مواجهه‌های احتمالی و حقیقی اندازه‌گیری شده توسط این روش مشاهده گردد می‌توان تأثیر فاکتورهای مؤثر در کاهش دادن میزان مواجهه حقیقی مانند فاکتور حفاظتی لباس و دستکش را به خوبی دریافت و همچنین می‌توان نواحی نیازمند بررسی و حفاظت بیشتر را شناسی نمود (۷، ۸). بر اساس یافته‌های این پژوهش و مطالعات متعدد قبلی می‌توان گفت هرچند زمان بر بودن و محاسبات تا حدودی پیچیده را می‌توان از موضع به کارگیری روزمره این روش بر شمرد اما روش ارزیابی نیمه کمی مواجهه پوستی DREAM می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای ارزیابی اولیه محیط‌های کاری استفاده گردد (۷، ۱۴).

سپاس‌گزاری

این مقاله از پایان‌نامه دانشجویی استخراج گردیده است. نویسنده‌گان این مقاله بر خود لازم می‌دانند از تمامی افراد شرکت‌کننده در این مطالعه، پرسنل محترم بیمارستان شهید صدوقی یزد و پرسنل محترم پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بقایی پور یزد به خاطر حسن همکاری و همراهی در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی می‌نمایند.

References:

1. Sartorelli P. *Dermal exposure assessment in occupational medicine*. Occupational medicine. 2002; 52(3): 151-6.
2. Ladeira C, Viegas S, Pádua M, Gomes M, Carolino E, Gomes M, et al. *Assessment of genotoxic effects in nurses handling cytostatic drugs*. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A. 2014; 77(14-16): 879-87.

جدول ۵ مقایسه میانگین نمره مواجهه واقعی در بخش‌های مختلف شیمی‌درمانی را نشان می‌دهد. تفاوت در میانگین نمره مواجهه واقعی بخش‌های مختلف شیمی‌درمانی معنادار بود و بخش «داخلی-۱» بیشترین میزان مواجهه واقعی را داشت و نیز مواجهه واقعی در بخش «امام حسن (ع)» از بخش «باقایی پور» بیشتر بود. چنانچه پیشتر ذکر گردید علیرغم تعداد بیشتر آماده‌سازی دارو در هر شیفت به ازای پرسنل این بخش‌ها از حسن (ع) و «باقایی پور» چون پرسنل این بخش‌ها از دستکش‌های لاتکس یک یا دولایه استفاده می‌کردند مواجهه واقعی آن‌ها در مقایسه با بخش «داخلی-۱» درصد کمتری از مواجهه احتمالی را شامل می‌شد.

بحث

در این تحقیق مواجهه پوستی ۳ گروه از کارکنان بخش‌های شیمی‌درمانی با داروهای ضد سرطان توسط کاربرد روش نیمه کمی DREAM مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از این روش برای ارزیابی میزان مواجهه پوستی توسط مطالعات متعدد دیگری گزارش گردیده است (۱۱، ۹-۷). بررسی میانگین نمره مواجهه حقیقی کارکنان بخش‌های مختلف نشان داد که تمامی گروه‌های مورد بررسی در دسته‌ی مواجهه خیلی کم با نمره مواجهه کمتر از ۱۰ قرار می‌گیرند. به دلیل آنکه در مطالعه‌ی حاضر پراکندگی داده‌ها بالاست در تفسیر نتایج حاصل از این پژوهش بایست جواب احتیاط را رعایت نمود. مشکل

3. Jakab MG, Major J, Tompa A. ***Follow-up genotoxicological monitoring of nurses handling antineoplastic drugs.*** Journal of Toxicology and Environmental Health Part A. 2001; 62(5): 307-18.
4. Afshar M, Shokraneh F, Monji F, Noroozi M, Ebrahimi-Khojin M, Madani SF, et al. ***Risks to health professionals from hazardous drugs in Iran.*** Experimental and Clinical Sciences. 2014; 13: 491-501.
5. Turci R, Sottani C, Spagnoli G, Minoia C. ***Biological and environmental monitoring of hospital personnel exposed to antineoplastic agents: a review of analytical methods.*** Journal of Chromatography B. 2003; 789(2): 169-209.
6. Viegas S, Pádua M, Veiga AC, Carolino E, Gomes M. ***Antineoplastic drugs contamination of workplace surfaces in two Portuguese hospitals.*** Environmental monitoring and assessment. 2014; 186(11): 7807-18.
7. Dehghani H, Zare Sakhvidi MJ, Lokzade Z, Kaighobadi N, Zare M. ***Dermal exposure in automotive repair workers; application of DREAM method.*** Iran Occupational Health. 2014; 11(6): 1-12. [Persian]
8. Van-Wendel-De-Joode B, Brouwer Dh, Vermeulen R, Van Hemmen Jj, Heederik D, Kromhout H. ***Dream: a method for semi-quantitative dermal exposure assessment.*** Annals of Occupational Hygiene. 2003; 47(1): 71-87.
9. de Joode BVW, Vermeulen R, Van Hemmen J, Fransman W, Kromhout H. ***Accuracy of a semiquantitative method for Dermal Exposure Assessment (DREAM).*** Occupational and Environmental Medicine. 2005; 62(9): 623-32.
10. Marquart J, Brouwer D, Gijsbers J, Links I, Warren N, Van Hemmen J. ***Determinants of dermal exposure relevant for exposure modelling in regulatory risk assessment.*** Annals of Occupational Hygiene. 2003; 47(8): 599-607.
11. de Joode BvW, Van Hemmen JJ, Meijster T, Major V, London L, Kromhout H. ***Reliability of a semi-quantitative method for dermal exposure assessment (DREAM).*** Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. 2005; 15(1): 111-20.
12. Loomis D, Kromhout H. ***Exposure variability: concepts and applications in occupational epidemiology.*** American journal of industrial medicine. 2004; 45 (1): 122-113.
13. de Joode BvW, Bierman E, Brouwer D, Spithoven J, Kromhout H. ***An assessment of dermal exposure to semi-synthetic metal working fluids by different methods to group workers for an epidemiological study on dermatitis.*** Occupational and Environmental Medicine. 2005; 62(9): 633-41.
14. Agostini M, Fransman W, De Vocht F, De Joode BVW, Kromhout H. ***Assessment of dermal exposure to bitumen condensate among road paving and mastic crews with an observational method.*** Annals of Occupational Hygiene. 2011; mer026.

Determine the average score of skin exposure to chemotherapy drugs in oncology staffs at hospitals and health services of Shahid Sadoughi university of medical Sciences and health Services by DREAM method in 2015

Mansouri Y¹, Dehghani A², Barkhordari A¹, Zare sakhvidi M^{*1}

¹ Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

² Department of Biostatistics and Epidemiology School of Public Health, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

Abstract

Introduction: Occupational dermal exposure to antineoplastic drugs is the one of the most important routes among healthcare staff. Several antineoplastic drugs have been classified as carcinogens by the International Agency for Research on Cancer (IARC). This study investigated dermal exposure of oncology divisions staff to the anticancer drugs (ANDs) in hospitals of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.

Method: In this descriptive and correlational study, the use of DREAM method for determination dermal exposure in chemotherapy personnel was investigated in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services. By assessment of probability and intensity emisson exposure, deposition exposour and transfer exposure for all of body parts calculated. Then, potential and actual exposure calculated and chemotherapy divisions classificated based on the DREAM average score, furthermore we assessed the correlation between various dermal exposure scores, occupational and demographical parameters.

Results: Maximum deposition dermal exposure (Mean=1.409, SD=0.127) was for the Baghaeepour division staff. Maximum transfer dermal exposure (Mean=3.500 , SD=0) was for the Imam Hassan division staff and maximum emmission dermal exposure (Mean=0.980 , SD=0.114) was for the Internal-1 division staff, respectively. The maximum potential and actual dermal exposure calculated (Mean= 5.133 , SD= 0) was for the Imam Hassan division staff and (Mean= 1.164 , SD= 0.152)) for the Internal-1 division staff.

Conclusion: Depending on the findings although DREAM is a time-consuming and has somewhat complicated calculations to be used as a daily assessment tool, it can be used as an effective tool for initial assessment of the skin exposure in working environments.

Keywords: Antineoplastic drugs, Chemotherapy personnel, Dermal exposure, DREAM method

This paper should be cited as:

Mansouri Y, Dehghani A, Barkhordari A, Zare sakhvidi M. *Determine the average score of skin exposure to chemotherapy drugs in oncology staffs at hospitals and health services of Shahid Sadoughi university of medical Sciences and health Services by DREAM method in 2015*. Occupational Medicine Quarterly Journal 2019; 11(1):10-17.

*** Corresponding Author**

Email: mjzs63@gmail.com

Tel: 989124481013

Received: 21.08.2016

Accepted: 17.04.2019